


# COVID-19 CASO PROBABLE

Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19,  
30 de Julio 2020, Versión N°15.1





El Centro de Salud donde se atiende el caso PROBABLE será el responsable de notificar al área rectora del Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud será el responsable de darle seguimiento al caso y a sus posibles contactos.

## Caso PROBABLE

Se define como:



1. Un caso sospechoso para quien la prueba para el virus SARS-CoV-2 no es concluyente o,
2. Un caso sospechoso para quien la prueba no pudo realizarse por algún motivo.

**Caso PROBABLE**



**¿Cuándo una muestra no es concluyente?**

1. Cuando la toma de la muestra se tomó o se transportó incorrectamente, lo cual produce una contaminación de la muestra y por ende un resultado no concluyente.



2. Otra causa sería que la carga viral de la muestra sea escasa, debido a que se tomó en un periodo donde no hay eliminación del virus en cantidades suficientes para poder detectar la infección.

Caso PROBABLE




¿En qué condiciones no puede realizarse la toma de la muestra?


- Por condiciones propias del paciente.
- Por aspectos del personal sanitario.



# COVID-19



## AISLAMIENTO





Caso PROBABLE


AISLAMIENTO

El aislamiento es una de las principales medidas de control, y debe ser aplicado a todos los casos sospechosos, probables y confirmados de enfermedad respiratoria por COVID-19.



Los casos probables se aislarán por 14 días a partir del inicio de los síntomas.




# COVID-19



## CONTACTO CERCANO








Se define como CONTACTO CERCANO con un caso sospechoso, probable o confirmado por COVID-19 a aquella persona que, sin haber utilizado las medidas de protección adecuadas tenga alguna de las siguientes condiciones:


1. Haya proporcionado cuidados a un CASO SINTOMÁTICO, ya sea en el entorno doméstico o de atención de salud.

2. Haya tenido exposición en forma directa a moco o saliva de una persona SINTOMÁTICA, ya sea producida por un estornudo o tosido, o por beso, o alimentos o utensilios de alimentación compartidos.



Caso PROBABLE

## DEFINICIÓN DE CONTACTO CERCANO



Caso PROBABLE



## DEFINICIÓN DE CONTACTO CERCANO




3. Haya estado cara a cara con un caso a menos de 1.8 metros de distancia y por más de 15 minutos.



4. Haya estado en un lugar cerrado (aula, oficina, sala de sesiones, área de espera o habitación) con un caso SINTOMÁTICO a una distancia menor de 1.8 metros, por un período mayor o igual a 15 minutos.





5. En el entorno de un avión, pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de un caso SINTOMÁTICO o la tripulación que brindó atención directa durante el vuelo a dicha persona.



Caso PROBABLE


Algunos ejemplos de contacto cercano en la vida cotidiana serían: **(recuerde que esto es aplicable cuando no se haya usado el equipo de protección personal y haya estado en contacto directo con un caso sospechoso, probable o confirmado):**




Si es cuidador de personas en el entorno familiar u hospitalario.



Si saluda de beso, abrazo, estrecha las manos, comparte comida y/o utensilios de cocina y personales.



Si no guarda la distancia de 1,8 metros.



Si asiste a reuniones, sesiones de trabajo que duran más de 15 minutos.

## DEFINICIÓN DE CONTACTO CERCANO

